# ２０１６年版 コピー厳禁　しゅんぎく　生産履歴記帳用紙　０１－　－０１

| 栽培開始年月 | 支所（コード／支所名） | 生産者（コード／氏名） | JA確認日 |
|---|---|---|---|
| 2016 年 08 月 | | | / |
| | | | JA確認印 |

■農薬使用について（○で囲んで下さい）

1．使用　　2．未使用

■品種名を記入

| 品種名（ 栽培する品種を記入） |
|---|
| |

■圃場番号を記入　■面積を記入

| 圃場番号 | 面積 |
|---|---|
| | . a |

■作業の管理（実施月/日を記入）

| 作業名 | 作業日 | 作業名 | 作業日 | 作業名 | 作業日 | 作業名 | 作業日 | 作業名 | 作業日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 播種日 | ／ | 定植日 | ／ | 収穫日① | ／ | 収穫日② | ／ | 収穫日③ | ／ |
| | ／ | | ／ | | ／ | | ／ | | ／ |

■肥料（基肥・追肥）・土壌改良資材等投入の記録

| 肥料名 | 施肥日 | 投入量（10aあたり） | 肥料名 | 施肥日 | 投入量（10aあたり） |
|---|---|---|---|---|---|
| | / | kg | | / | kg |
| | / | kg | | / | kg |
| | / | kg | | / | kg |
| | / | kg | | / | kg |

■病害虫防除の記録（散布実施月/日を記入（農薬の手書き時は薬剤名も記入））

| | 適用病害虫 | 適正使用基準 | | | | 散布実施月/日 ① | 散布実施月/日 ② | 散布実施月/日 ③ | 散布実施月/日 ④ | 散布実施月/日 ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 薬剤名 | 薬量・倍率（10aあたり） | 使用時期（～日前） | 回数 | | | | | |
| 1 | ﾊﾀﾞﾆ類 | アカリタッチ乳剤 | 1000～3000倍 | 収穫前日まで | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 2 | ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｼﾛ | アファーム乳剤 | 2000倍 | 収穫7日前まで | 2 | ／ | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 3 | ﾈｷﾘﾑｼ類 | ガードベイトA | 3kg/10a | 生育初期 | 2 | ／ | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 4 | ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊｽ | カスケード乳剤 | 2000～4000倍 | 収穫7日前まで | 2 | ／ | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 5 | ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ | コテツフロアブル | 2000倍 | 収穫前日まで | 2 | ／ | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 6 | | | | | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |

# ２０１６年版 コピー厳禁　しゅんぎく　生産履歴記帳用紙　０２－　－０２

■病害虫防除の記録（散布実施月/日を記入（農薬の手書き時は薬剤名も記入））

| | 適用病害虫 | 適正使用基準 | | | | 散布実施月/日 ① | 散布実施月/日 ② | 散布実施月/日 ③ | 散布実施月/日 ④ | 散布実施月/日 ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 薬剤名 | 薬量・倍率（10aあたり） | 使用時期（～日前） | 回数 | | | | | |
| 1 | ﾈｷﾘﾑｼ類 | カルホス微粒剤F | 6kg/10a | 定植時 | 1 | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 2 | ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 | スタークル粒剤 | 9kg/10a | 定植時 | 1 | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 3 | ﾖﾄｳﾑｼ | トアロー水和剤CT | 500～1000倍 | 収穫前日まで | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 4 | ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 | モスピラン顆粒水溶剤 | 8000倍 | 収穫14日前まで | 2 | ／ | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 5 | | | | | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 6 | | | | | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 7 | 炭疽病 | アミスター2Oフロアブル | 2000倍 | 収穫前日まで | 2 | ／ | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 8 | うどんこ病 | ジーファイン水和剤 | 750～1000倍 | 収穫前日まで | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 9 | 炭疽病 | ストロビーフロアブル | 3000倍 | 収穫14日前まで | 3 | ／ | ／ | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 10 | べと病 褐斑細菌病 | Zボルドー | 500倍 | － | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 11 | | | | | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 12 | 萎凋病 一年生雑草 | ガスタード微粒剤 | 20kg/10a | は種21日前まで | 1 | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 13 | | | | | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 14 | 一年生雑草 | ラウンドアップマックスロード | 200～500ml | 耕起前まで(雑草 | 1 | ／ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ | ＊＊／＊＊ |
| 15 | | | | | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| 16 | | | | | | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ |
| | 備考欄 | | | | | | | | | |